

Dag:	Instructie:	Toelichting:
Dag -1	Het is NIET nodig om het continue infuus flucloxacilline te onderbreken	Ook op de testdag en gedurende de test mag het continue infuus flucloxacilline doorgegeven worden.
Testdag	<p><u>t=0 min</u>: dalspiegel afnemen, hierna inname testdosis van 1 gram flucloxacilline met water</p> <p><u>t=45 min</u>: 3/4 uurs waarde afnemen</p> <p><u>t=90 min</u>: 1 1/2 uurs waarde afnemen, hierna einde test</p>	<p>De patiënt moet 'nuchter' zijn voor de test: dit betekent dat deze vanaf 2 uur voor de test tot één uur na de inname van de testdosis geen voedsel of dranken mag gebruiken. Water is wel toegestaan. Overige medicamenten mogen worden ingenomen, dit moet dan wel op de aanvraag genoteerd worden.</p> <p>Exacte tijdstippen van inname en bloedafname op formulier noteren (dus niet de gewenste tijden).</p> <p>Bij onduidelijkheden contact opnemen met de dienstdoend infectioloog of apotheker.</p>

Streefconcentratie: het verschil tussen de dalspiegel (*t=0 min*) en de spiegel op 45 en/of 90 min., moet tenminste 10 mg/L bedragen.